



Памятка пациента После операции дентальной имплантации

Нормальная реакция в первую неделю после операции: незначительные боли, припухлость, кровоточивость, небольшое повышение температуры и онемение в отдельных участках кожи. В это время советуем в области установленных имплантов держать лед в пакете: 20 мин держим, 30 мин. перерыв.

Настоятельно просим:

- не принимать пищу в течение 2-х часов, не курить в первые сутки после операции;
- первые 2 дня принимать мягкую, протертую и умеренно теплую пищу, если были оперированы обе стороны, мягкую пищу следует есть до тех пор, пока не будут удалены швы;
- использовать ночью несколько подушек, чтобы голова была приподнята;
- не проводить самостоятельно ревизию места операции пальцами, зубочистками и прочими подручными средствами.

Швы врач снимет через 10-14 дней. Имплантаты будут 6 месяцев приживаться на верхней и 3 – на нижней челюсти.

Позвоните или покажитесь для внепланового осмотра, если спустя несколько часов продолжается кровотечение, не проходит полностью ощущение онемения в зоне операции, если температура поднялась выше 38 градусов или держится более 3 дней; если спустя 2-3 дня есть признаки нарастания острой боли, резкой болезненности при дотрагивании языком до места операции.

Необходимым условием для сохранения установленных имплантов является эффективная гигиена полости рта.